



齒齦下結石刮除暨牙根整平術治療注意事項

2018.03制定

● 治療前注意事項

1. 血友病、肝硬化、抗凝血藥、長期吃抗生素者其凝血功能會異常。
2. 裝置人工瓣膜、曾患心內膜炎、先天性心臟問題未修復時、及置換人工關節(且骨科醫師建議需要給藥的人)，治療前半小時預防性給抗生素藥，避免心臟瓣膜或內襯表皮表面受感染而造成「細菌性心內膜炎」。

● 治療後注意事項

1. 齒齦下結石刮除暨牙根整平術剛治療完可能會有牙齦輕度不適，之後常見牙齦因消腫而有牙齦退縮，對於冷熱刺激敏感，齒齦間隙縫變大，皆為感染發炎控制後無法避免的結果。
2. 可能有牙齦出血的現象，請避免將口水吐出、大力漱口、使用吸管飲水等任何可能造成凝血血塊脫落因而增長出血時間的動作。如果已採取上述防範措施卻有大量且長時間的出血，請回診或與原治療醫師聯絡。
3. 牙周病治療通常會在局部麻醉下進行，請於麻藥消退後再用餐，避免咬傷臉頰肉。術後前一至二周應避免食用溫熱或有辣等刺激性食物，減少對傷口的刺激，也應依醫師囑咐按時服用藥物。
4. 平日確實按照建議的方式清潔牙齒，並且配合安排時間定期回診，以維持牙周病的治療效果。

● 諮詢時間:週一至週五上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

● 諮詢電話:牙科櫃台(06)2353535轉2955

牙周病科櫃台(06)2353535轉2971

我們樂意為您服務。祝您 平安健康